

# CHLAMYDIA

## WHAT IS IT?

Chlamydia is a sexually transmitted disease (STD). You can get it from having sex (vaginal, anal, or oral) with someone who has chlamydia. It can be cured with the right medicine.

## WHAT TO LOOK FOR

Men may have a white or clear watery drip from the penis. Women may have more discharge (flow) from the vagina than usual. It may also burn or hurt to pee. You may have these signs one to three weeks after sex with someone who has chlamydia. Later, women may also feel pain in the lower belly.

Many men and most women with chlamydia don't have any signs at all. They don't know they are sick. But they can still give chlamydia to anyone they have sex with.

## IF NOT TREATED

Chlamydia is a serious disease. If you don't get treated, it can spread in your body. Both men and women may not be able to have children. If you are pregnant, your baby can be born sick with chlamydia.

## HOW TO FIND OUT IF YOU HAVE IT

Go to a clinic or doctor right away to get checked. STD testing and treatment are free and confidential at all Los Angeles County STD clinics.

If you have chlamydia, you will be given medicine to take. Keep taking the medicine until it's all gone, even if you feel better. It takes one week for the medicine to cure the disease. Tell your sex partner(s) that they may have chlamydia and need to get checked. Don't have sex until both you and your partner(s) are treated.

## PROTECT YOURSELF!

If you have sex, using a latex condom (rubber) is the best way to protect yourself from STDs. Limit your number of sex partners. The more people you have sex with, the greater your chance of getting an STD. If you have sex with more than one partner, get an STD exam every 6 months.

**For more information and clinic locations  
Call the STD/HIV InfoLine  
(800) 758-0880**

[www.lapublichealth.org/std](http://www.lapublichealth.org/std)  
Los Angeles County STD Program, 2003

# CLAMIDIA

## ¿QUÉ ES?

Clamidia es una enfermedad transmitida sexualmente (ETS). Se contrae al tener relaciones sexuales (vaginal, anal u oral) con alguien que tiene clamidia. Se puede curar con la medicina apropiada.

## QUE NOTAR

Los hombres pueden tener un flujo (desecho) claro o blanco saliendo del pene. Mujeres pueden tener mas flujo (desecho) de lo normal saliendo de la vagina. Puede arder o doler al orinar. Estos síntomas pueden aparecer de una a tres semanas después de tener relaciones con alguien que tiene clamidia. Despues, algunas mujeres pueden sentir dolor en la parte baja del abdomen.

Muchos hombres y la mayoría de mujeres con clamidia no tienen estos síntomas. No saben que están enfermos, pero pueden contagiar con clamidia a cualquier persona con quien tengan relaciones.

## SI NO RECIBE TRATAMIENTO

Clamidia es una enfermedad seria. Si no es atendida, puede extenderse en su cuerpo. Tal vez no pueden tener hijos tanto los hombres como las mujeres. Si está embarazada, su bebé puede nacer enfermo con clamidia.

## ¿CÓMO PUEDE SABER SI LA TIENE?

Vaya a una clínica o a un doctor inmediatamente para un examen. Exámenes y tratamiento para ETS son gratis y confidenciales en todas las clínicas de ETS en el Condado de Los Angeles.

Si tiene clamidia, le darán medicina para tomar. Siga tomando la medicina hasta que se acabe, aunque se sienta mejor. La medicina tarda una semana para curar la enfermedad. Dígale a su(s) pareja(s) que es posible que tenga(n) clamidia y que necesita(n) un examen. No tenga relaciones hasta que usted y su(s) pareja(s) hayan terminado el tratamiento.

## ¡PROTÉJASE!

Si tiene relaciones, usando un condón (preservativo) de látex es la mejor manera de protegerse de ETS. Limité el número de parejas sexuales. Entre más parejas sexuales tenga, más alto es su riesgo de contraer una ETS. Si tiene relaciones con más de una persona, hágase un examen de ETS cada 6 meses.

**Para más información  
y localidad de clínicas llame a  
(800) 758-0880**

[www.lapublichealth.org/std](http://www.lapublichealth.org/std)  
Los Angeles County STD Program, 2003